

平成 29 年度 数学演習第一

演習第 9 回 (7 月 5 日 実施分) 微積：漸近展開，積分の計算 (1) 解答例

0 順に $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)}{x^n} = 0, \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}, \frac{(-1)^k}{(2k)!}, \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}, \frac{1}{k!}, \frac{(-1)^{k-1}}{k}$

1 (以下，本問でランダウの o を使うときはいつも， $(x \rightarrow 0)$ を省略している.)

(1) (c) 式の x を $-x^2$ に置き換えて，

$$e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + o(x^6) = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + o(x^6)$$

(2) (a) 式で $\alpha = -\frac{1}{2}$ として， $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{2}x^2 + \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{6}x^3 + o(x^3) = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + o(x^3)$. x を $-x^2$ に置き換えて， $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{3}{8}x^4 + \frac{5}{16}x^6 + o(x^6)$.

(3) (c) 式の x を $-x$ に置き換えて， $e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$. よって， $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ より

$$\begin{aligned} \sinh x &= \frac{1}{2} \left\{ \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \right) - \left(1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \right) \right\} \\ &= x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^4). \end{aligned}$$

(4) $\frac{x}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{1-x} - \frac{2}{2-x} \cdot \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + o(x^4)$. $\frac{2}{2-x} = \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = 1 + \frac{x}{2} + \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^3 + \left(\frac{x}{2}\right)^4 + o(x^4)$ だから， $\frac{x}{x^2 - 3x + 2} = \frac{x}{2} + \frac{3}{4}x^2 + \frac{7}{8}x^3 + \frac{15}{16}x^4 + o(x^4)$.

(5) (a) 式において $\alpha = -\frac{1}{2}$ とすると， $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \frac{35}{128}x^4 + o(x^4)$. これより，

$$\frac{1-x}{\sqrt{1+x}} = (1-x) \left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + \frac{35}{128}x^4 + o(x^4) \right) = 1 - \frac{3}{2}x + \frac{7}{8}x^2 - \frac{11}{16}x^3 + \frac{75}{128}x^4 + o(x^4).$$

(6) (b) 式から $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + o(x^6)$. (d) 式で x を $-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + o(x^6)$ に置き換えて

$$\begin{aligned} \log(\cos x) &= \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} \right) - \frac{1}{2} \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} \right)^2 + \frac{1}{3} \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} \right)^3 + o(x^6) \\ &= -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{12}x^4 - \frac{1}{45}x^6 + o(x^6) \end{aligned}$$

(7) (2) を積分して $\text{Sin}^{-1}x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + o(x^7)$

(8) (b) 式の x を $x^2 + x$ に置き換えて， $\sin(x^2 + x) = (x^2 + x) - \frac{(x^2 + x)^3}{3!} + o(x^4) = x + x^2 - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$. よって，

$$\int_0^x \sin(t^2 + t) dt = \int_0^x \left(t + t^2 - \frac{1}{6}t^3 + o(t^3) \right) dt = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{24}x^4 + o(x^4).$$

(9) $\frac{1}{\cos x} = \frac{1}{1 + \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)\right)}$ として (a) 式を用いると

$$\frac{x}{\cos x} = x \left\{ 1 - \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5) \right) + \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5) \right)^2 + o(x^5) \right\} = x + \frac{1}{2}x^3 + \frac{5}{24}x^5 + o(x^5).$$

($f(x)$ は奇関数のため， $f(x) = a_1x + a_3x^3 + a_5x^5 + o(x^5)$ とおき， $x = f(x) \cos x$ に代入して， $x = (a_1x + a_3x^3 + a_5x^5 + o(x^5)) \left(1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + o(x^5) \right)$ を展開して比較することでも求められる.)

(10) $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \sin x \cdot \frac{1}{\cos x}$ とみる. (9) の式をよく見ると， $\frac{1}{\cos x} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{24}x^4 + o(x^5)$ であることが

わかるから， $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$ を用いて

$$\tan x = \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \right) \left(1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{24}x^4 \right) + o(x^5) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).$$

別解: $f(x) = \tan x$ は奇関数なので, $f'(x)$ は偶関数で, $f'(x) = a_0 + a_2x^2 + a_4x^4 + o(x^4)$ と表せる. 他方, $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ および (b) 式の x を $2x$ に置き換えて

$$1 = f'(x) \cos^2 x = f'(x) \frac{1 + \cos 2x}{2} = (a_0 + a_2x^2 + a_4x^4 + o(x^4)) \frac{1 + \{1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^4)\}}{2}$$

$$= (a_0 + a_2x^2 + a_4x^4 + o(x^4)) \left(1 - x^2 + \frac{1}{3}x^4 + o(x^4)\right) = a_0 + (a_2 - a_0)x^2 + \left(a_4 - a_2 + \frac{1}{3}a_0\right)x^4 + o(x^4)$$

より, $a_0 = 1, a_2 = a_0 = 1, a_4 = a_2 - \frac{1}{3}a_0 = \frac{2}{3}$ を得る. つまり, $f'(x) = 1 + x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^4)$ を積分して

$$f(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).$$

注意: $\int_0^x o(t^n)dt = o(x^{n+1})$ は成り立つが, (この微分バージョン?) $\frac{d}{dx}o(x^n) = o(x^{n-1})$ は成り立つとは限らない. 例えば, $f(x) = x^{n+1} \sin \frac{1}{x}$ とすると $f(x) = o(x^n)$ だが, $f'(x) = (n+1)x^n \sin \frac{1}{x} - x^{n-1} \cos \frac{1}{x}$ に対して $f'(x) = o(x^{n-1})$ ではない (意欲的な諸君は証明してみよう). 従って, 例えば $\tan x$ の漸近展開を求めるのに, $(\log(\cos x))' = -\tan x$ であることから, $\log(\cos x)$ の漸近展開 (6) を微分して求めるという方法は (現在までの学習内容だけでは) 正当化するのが難しい. これらは, 2 学期の「解析学」の講義で整級数展開を学ぶことで正当化できるようになる.

2 (1) 1(3) を用いて $\sinh^2 x = \left(x + \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right)^2 = x^2 + \frac{x^4}{3} + o(x^4)$. よって,

$$\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sinh^2 x} = \frac{\sinh^2 x - x^2}{x^2 \sinh^2 x} = \frac{\frac{x^4}{3} + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)} \rightarrow \frac{1}{3} \quad (x \rightarrow 0).$$

(2) (b) 式から $\sin(x^2) = x^2 - \frac{x^6}{6} + o(x^6)$ より,

$$\frac{1}{x^7} \int_0^x (\sin(t^2) - t^2) dt = \frac{1}{x^7} \int_0^x \left(-\frac{t^6}{6} + o(t^6)\right) dt = \frac{1}{x^7} \left(-\frac{x^7}{42} + o(x^7)\right) \rightarrow -\frac{1}{42} \quad (x \rightarrow 0).$$

3 (不定積分に対する積分定数は省略する.)

(1) (i) $e^x = t$ とおくと, $e^x dx = dt$ より, $\int \frac{e^{2x}}{e^x + 1} dx = \int \frac{t}{t+1} dt = \int \left(1 - \frac{1}{t+1}\right) dt = e^x - \log(e^x + 1)$.

(ii) 部分積分法により, $\int x^2 \log x dx = \int \left(\frac{x^3}{3}\right)' \log x dx = \frac{x^3 \log x}{3} - \int \frac{x^3}{3} \cdot (\log x)' dx = \frac{x^3 \log x}{3} - \int \frac{x^2}{3} dx$
 $= \frac{x^3 \log x}{3} - \frac{x^3}{9} = \frac{x^3}{9}(3 \log x - 1)$. (iii) $\cos x = t$ とおくと $-\sin x dx = dt$ より, $\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\sin x}{\sin^2 x} dx = \int \frac{\sin x}{1 - \cos^2 x} dx = \int \frac{dt}{t^2 - 1} = \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1}\right) dt = \frac{1}{2} \log \left|\frac{t-1}{t+1}\right| = \frac{1}{2} \log \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$.

(iv) $m \neq n$ のとき, 与えられた定積分は, $-\frac{1}{2} \int_0^\pi \{\cos(m+n)x - \cos(m-n)x\} dx = -\frac{1}{2} \left[\frac{\sin(m+n)x}{m+n} - \frac{\sin(m-n)x}{m-n}\right]_0^\pi = 0$. $m = n$ のとき, $\int_0^\pi \sin^2 mx dx = \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2mx}{2} dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{\sin 2mx}{2m}\right]_0^\pi = \frac{\pi}{2}$.

(v) 与えられた定積分を I とすると, $I = [e^{-x} \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x} \sin x dx = e^{-\frac{\pi}{2}} + [-e^{-x} \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x} \cos x dx$
 $= e^{-\frac{\pi}{2}} + 1 - I$ となるので, $I = \frac{1}{2}(e^{-\frac{\pi}{2}} + 1)$.

(vi) $\int_0^\pi \left|\sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right| dx = \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) dx - \int_{\frac{3\pi}{4}}^\pi \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) dx = [-\sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)]_0^{\frac{3\pi}{4}} - [-\sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)]_{\frac{3\pi}{4}}^\pi = 2\sqrt{2}$.

(vii) $\cos x = t$ とおくと, $-\sin x dx = dt$ より, 与えられた定積分は $-\int_{\frac{1}{2}}^{-\frac{1}{2}} \log(1-t^2) dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left\{\log(1-t) + \log(1+t)\right\} dt = [(t-1) \log(1-t) + (1+t) \log(1+t) - 2t]_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} = 3 \log 3 - 2 \log 2 - 2$.

(2) (i) $f'(x) = \frac{1}{\log x^3} \cdot 3x^2 - \frac{1}{\log x^2} \cdot 2x = \frac{x^2 - x}{\log x}$. (ii) $\int_0^x (t-x) \sin t dt = \int_0^x t \sin t dt - x \int_0^x \sin t dt$ より,
 $g'(x) = x \sin x - \int_0^x \sin t dt - x \sin x = -\int_0^x \sin t dt = [\cos t]_0^x = \cos x - 1$.