

数学演習第一 (演習第 10 回)

線形 : 4 次以上の行列式

2018 年 7 月 11 日

- 1** A を 4 次正方行列とし, $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \\ \mathbf{c} \\ \mathbf{d} \end{bmatrix}$ を A の行ベクトル分割とする. A の行列式 $|A|$ の値が 3 であるとき, 以下の行列式の値を求めよ.

$$(1) \text{ 行列式 } \begin{vmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \\ \mathbf{c} \\ \mathbf{b} \end{vmatrix} \quad (2) \text{ 行列式 } \begin{vmatrix} \mathbf{a} + \mathbf{c} \\ \mathbf{b} \\ \mathbf{c} \\ 2\mathbf{d} \end{vmatrix} \quad (3) \text{ 行列式 } \begin{vmatrix} \mathbf{a} \\ 2\mathbf{b} - 3\mathbf{a} \\ \mathbf{a} + 2\mathbf{b} - \mathbf{c} \\ 2\mathbf{a} - 3\mathbf{b} + 4\mathbf{c} + 3\mathbf{d} \end{vmatrix} \quad (4) \text{ 行列式 } \det(2A) \quad (5) |{}^t A|$$

- 2** 演習書問題 9.3.2(3), 問題 9.3.3 を解け. (教科書 例題 10.7 が基本. 教科書 p.77 にある列基本変形も有効.)

$$(1) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \quad (2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 12 & 13 & 14 & 5 \\ 11 & 16 & 15 & 6 \\ 10 & 9 & 8 & 7 \end{vmatrix} \quad (3) \begin{vmatrix} 2 & 8 & 4 & 1 \\ 7 & 6 & 7 & 1 \\ 2 & 4 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 5 & 1 \end{vmatrix} \quad (4) \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 \\ 1 & 7 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & -5 & 3 \\ 4 & -3 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

- 3** 行列 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ に関する以下の問い合わせよ.

- (1) 行列式 $|A|$ の値を求めよ.
(2) 余因子行列 \tilde{A} を求めよ.

- 4** n 次正方行列 A の余因子行列を \tilde{A} , E を n 次単位行列とする.

- (1) $|dE|$ (d はスカラー) を d を用いて表せ. (2) $|\tilde{A}|$ を $|A|$ を用いて表せ.
((2) のヒント: 恒等式 $A\tilde{A} = |A|E$ の両辺の行列式をとって, 左辺には教科書定理 11.3, 右辺には (1) を適用.)

- 5** 5 つの 4 次の列ベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{e}$ の間には,

$$|\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}| = 3, \quad |\mathbf{e}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}| = 1, \quad |\mathbf{a}, \mathbf{e}, \mathbf{c}, \mathbf{d}| = 3, \quad |\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{e}, \mathbf{d}| = 6, \quad |\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{e}| = -6,$$

という, 4 次の行列式を用いた関係式があるという. スカラー w, x, y, z, t の間には, $w\mathbf{a} + x\mathbf{b} + y\mathbf{c} + z\mathbf{d} + t\mathbf{e} = 0$ という関係式があるとき, w, x, y, z それぞれを t の式で表せ.

- 6** (1) $|P_5| = \begin{vmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 & 0 & 0 \\ \sin \theta_1 \cos \theta_2 & \cos \theta_1 \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & 0 \\ \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3 & \cos \theta_1 \sin \theta_2 \cos \theta_3 & \cos \theta_2 \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cos \theta_4 & \cos \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \cos \theta_4 & \cos \theta_2 \sin \theta_3 \cos \theta_4 & \cos \theta_3 \cos \theta_4 & -\sin \theta_4 \\ \sin \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \sin \theta_4 & \cos \theta_1 \sin \theta_2 \sin \theta_3 \sin \theta_4 & \cos \theta_2 \sin \theta_3 \sin \theta_4 & \cos \theta_3 \sin \theta_4 & \cos \theta_4 \end{vmatrix}$

の値を求めよ. より一般に, $P_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{bmatrix}$ とし, $n \geq 2$ なる自然数に対し, 帰納的に,

$$P_{n+1} = \begin{bmatrix} P'_n & \mathbf{0} \\ \mathbf{p}_n \cos \theta_n & -\sin \theta_n \\ \mathbf{p}_n \sin \theta_n & \cos \theta_n \end{bmatrix}, \quad \text{ただし, } P_n = \begin{bmatrix} P'_n \\ \mathbf{p}_n \end{bmatrix} (\mathbf{p}_n \text{ は } P_n \text{ の第 } n \text{ 行})$$

と定義するとき, $|P_n|$ の値を求めよ.

- (2) x の 5 次式 $\begin{vmatrix} x & b_{12} & b_{13} & b_{14} & b_{15} & 1 \\ a_1 & x & b_{23} & b_{24} & b_{25} & 1 \\ a_1 & a_2 & x & b_{34} & b_{35} & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & x & b_{45} & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & x & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & 1 \end{vmatrix}$ を因数分解せよ.