

2018年11月14日 実施

1 次の2変数関数のマクローリン展開の公式を利用する：

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y + \frac{1}{2}\{f_{xx}(0, 0)x^2 + 2f_{xy}(0, 0)xy + f_{yy}(0, 0)y^2\} \\ & + \frac{1}{3!}\{f_{xxx}(0, 0)x^3 + 3f_{xxy}(0, 0)x^2y + 3f_{xyy}(0, 0)xy^2 + f_{yyy}(0, 0)y^3\} + \cdots \end{aligned} \quad (\text{a})$$

(1) $f(x, y) = \cos(x + y^2)$ より,

$$\begin{aligned} f_x &= -\sin(x + y^2), f_y = -2y \sin(x + y^2), \\ f_{xx} &= -\cos(x + y^2), f_{xy} = -2y \cos(x + y^2), f_{yy} = -4y^2 \cos(x + y^2) - 2 \sin(x + y^2), \\ f_{xxx} &= \sin(x + y^2), f_{xxy} = 2y \sin(x + y^2), f_{xyy} = 4y^2 \sin(x + y^2) - 2 \cos(x + y^2), \\ f_{yyy} &= 8y^3 \sin(x + y^2) - 12y \cos(x + y^2). \end{aligned}$$

点 $(0, 0)$ での値を (a) に代入して,

$$\cos(x + y^2) = 1 - \frac{1}{2}x^2 - xy^2 + \cdots$$

【別解】 1変数のマクローリン展開の公式

$$g(t) = g(0) + \sum_{k=1}^n \frac{g^{(k)}(0)}{k!} t^k + \cdots$$

を利用する。ここでは、特に $n = 2, t = x + y^2, g(t) = \cos t$ として適用し、2変数多項式として4次以上の項を無視して展開し、昇べきの順に並べると

$$\cos(x + y^2) = \cos t = 1 - \frac{1}{2!}t^2 + \cdots = 1 - \frac{1}{2}(x + y^2)^2 + \cdots = 1 - \frac{1}{2}x^2 - xy^2 + \cdots$$

(2) (a) の展開式を利用するのもよいが、 $f(x, y) = a^{x+2y} = e^{(x+2y)\log a}$ より、指數関数のマクローリン展開

$$e^t = 1 + t + \frac{1}{2!}t^2 + \frac{1}{3!}t^3 + \cdots$$

を用いる方が易しい。つまり、 $t = (\log a)(x + 2y)$ を代入すると

$$a^{x+2y} = 1 + (\log a)(x + 2y) + \frac{(\log a)^2}{2}(x^2 + 4xy + 4y^2) + \frac{(\log a)^3}{6}(x^3 + 6x^2y + 12xy^2 + 8y^3) + \cdots$$

因みに、 f の3次までの偏導関数は次の通りである：

$$\begin{aligned} f_x &= (\log a)a^{x+2y}, f_y = 2(\log a)a^{x+2y}, f_{xx} = (\log a)^2a^{x+2y}, f_{xy} = 2(\log a)^2a^{x+2y}, f_{yy} = 4(\log a)^2a^{x+2y}, \\ f_{xxx} &= (\log a)^3a^{x+2y}, f_{xxy} = 2(\log a)^3a^{x+2y}, f_{xyy} = 4(\log a)^3a^{x+2y}, f_{yyy} = 8(\log a)^3a^{x+2y}. \end{aligned}$$

(3) (2) と同様に、ここでも (a) を使うよりも、対数関数のマクローリン展開

$$\log(x + 1) = x - \frac{1}{2}x^2 + \cdots$$

を用いる方が簡単になる。すなわち、

$$y \log(x + 1) = y \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \cdots \right) = xy - \frac{1}{2}x^2y + \cdots$$

因みに、 f の3次までの偏導関数は次の通りである：

$$\begin{aligned} f_x &= \frac{y}{x + 1}, f_y = \log(x + 1), f_{xx} = \frac{-y}{(x + 1)^2}, f_{xy} = \frac{1}{x + 1}, f_{yy} = 0, \\ f_{xxx} &= \frac{2y}{(x + 1)^3}, f_{xxy} = \frac{-1}{(x + 1)^2}, f_{xyy} = f_{yyy} = 0. \end{aligned}$$

【参考】 x, y の n 次多項式 $P(x, y)$ が $f(x, y)$ の n 次のマクローリン展開であることと

$$f(x, y) = P(x, y) + o((\sqrt{x^2 + y^2})^n) \quad ((x, y) \rightarrow (0, 0)) \quad (\text{b})$$

が成り立つことは同値である。この事実は、(a) で定義された $f(x, y)$ の n 次マクローリン展開が、(a) を使わなくて、(b) をみたす n 次多項式 $P(x, y)$ を見つけられれば、 $P(x, y)$ が $f(x, y)$ の n 次マクローリン展開となることを示している。これより上述のような (a) を用いないマクローリン展開の導出が許される。

2

(5) は $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0, D(0,0) = 0$ となる問題である. ここで

$$D(a,b) := f_{xx}(a,b)f_{yy}(a,b) - \{f_{xy}(a,b)\}^2$$

とおいた. 極値の定義が以下のように与えられることに注意して, $f(0,0)$ が極値かどうか判定する.

$f(a,b)$ が極大値(または極小値)であるとは, (a,b) に十分近い (a,b) 以外の全ての点で, 不等式 $f(x,y) < f(a,b)$ (または $f(x,y) > f(a,b)$) が成り立つときをいう. 【注】この定義において, $< (>)$ を $\leq (\geq)$ で置き換えて, 広義の極大値(広義の極小値)を定義することがある.

- (1) $f(x,y) = e^{xy}$. $f_x = ye^{xy}, f_y = xe^{xy}$ より, $f_x(0,0) = 0, f_y(0,0) = 0$. $f_{xx} = y^2e^{xy}, f_{xy} = e^{xy} + xye^{xy}, f_{yy} = x^2e^{xy}$ より, $D(0,0) = -1 < 0$. よって $f(x,y)$ は $(0,0)$ で極値を取らない.
- (2) $f(x,y) = \log(x^2 + y^2 + 1)$. $f_x = \frac{2x}{x^2 + y^2 + 1}, f_y = \frac{2y}{x^2 + y^2 + 1}$ より, $f_x(0,0) = 0, f_y(0,0) = 0$. $f_{xx} = \frac{2(-x^2 + y^2 + 1)}{(x^2 + y^2 + 1)^2}, f_{xy} = \frac{-4xy}{(x^2 + y^2 + 1)^2}, f_{yy} = \frac{2(x^2 - y^2 + 1)}{(x^2 + y^2 + 1)^2}$ より, $D(0,0) = 4 > 0, f_{xx}(0,0) = 2 > 0$. よって $f(x,y)$ は $(0,0)$ で極小値を取る.
- (3) $f(x,y) = -x^2 + xy - y^2$. $f_x = -2x + y, f_y = x - 2y$ より, $f_x(0,0) = 0, f_y(0,0) = 0$. $f_{xx} = -2, f_{xy} = 1, f_{yy} = -2$ より, $D(0,0) = 3 > 0, f_{xx}(0,0) = -2 < 0$. よって $f(x,y)$ は $(0,0)$ で極大値を取る.
- (4) $f(x,y) = \cos x + \cos y + 2xy$. $f_x = -\sin x + 2y, f_y = -\sin y + 2x$ より, $f_x(0,0) = 0, f_y(0,0) = 0$. $f_{xx} = -\cos x, f_{xy} = 2, f_{yy} = -\cos y$ より, $D(0,0) = -3 < 0$. よって $f(x,y)$ は $(0,0)$ で極値を取らない.
- (5) $f(x,y) = 4x^2 + 4xy^2 + y^4 = (2x + y^2)^2$. $(x,y) \neq (0,0)$ が $x = -\frac{1}{2}y^2$ を満たすとき $f(x,y) = 0 = f(0,0)$ となるので, $f(x,y)$ は $(0,0)$ で極値を取らない.

3

以下の極値を取るための十分条件を利用する $f(x,y)$ が (a,b) の近くで, 連続な 2 階偏導関数を持ち, $f_x(a,b) = f_y(a,b) = 0$ とする. さらに, $D(a,b) = f_{xx}(a,b)f_{yy}(a,b) - \{f_{xy}(a,b)\}^2$ とおくとき,

- (i) $D(a,b) > 0$ のとき, $\begin{cases} f_{xx}(a,b) > 0 \Rightarrow f(a,b) \text{ は極小値}, \\ f_{xx}(a,b) < 0 \Rightarrow f(a,b) \text{ は極大値}. \end{cases}$ (極値を取るための十分条件)
- (ii) $D(a,b) < 0$ のとき, $f(a,b)$ は極値でない.
- (iii) $D(a,b) = 0$ のとき, 極値を取るか取らないかのいずれか一方であるが, この方法では判定できない. ([2] 参照)

- (1) $f(x,y) = x^2 - xy + y^2 - x - 4y$. $\begin{cases} f_x = 2x - y - 1 = 0 \\ f_y = -x + 2y - 4 = 0 \end{cases}$ を解いて, $(x,y) = (2,3)$ (この点が極値を与える候補). $f_{xx} = 2, f_{xy} = -1, f_{yy} = 2$ より, $D(2,3) = f_{xx}(2,3)f_{yy}(2,3) - f_{xy}(2,3)^2 = 2 \cdot 2 - (-1)^2 = 3 > 0$. よって, $f(x,y)$ は $(2,3)$ で極小値 $f(2,3) = -7$ を取る.
- (2) $f(x,y) = x^4 - 2x^3 + x^2 + y^2$. $\begin{cases} f_x = 4x^3 - 6x^2 + 2x = 2x(x-1)(2x-1) = 0 \\ f_y = 2y = 0 \end{cases}$ より $(x,y) = (0,0), (1,0), (1/2,0)$ (この 3 点が極値を与える候補). $f_{xx} = 12x^2 - 12x + 2, f_{xy} = 0, f_{yy} = 2$ より, $D(x,y) = f_{xx}(x,y)f_{yy}(x,y) - f_{xy}(x,y)^2 = 4(6x^2 - 6x + 1)$. $D(0,0) = D(1,0) = 4 > 0, f_{xx}(0,0) = f_{xx}(1,0) = 2 > 0$ より, $f(x,y)$ は $(0,0), (1,0)$ で極小値 $f(0,0) = f(1,0) = 0$ を取る. 一方, $D(1/2,0) = -2 < 0$ より $f(x,y)$ は $(1/2,0)$ では極値を取らない.
- (3) $f(x,y) = xy(x+y-1)$. $\begin{cases} f_x = y(2x+y-1) = 0 \\ f_y = x(x+2y-1) = 0 \end{cases}$ を解いて $(x,y) = (0,0), (1,0), (0,1), (1/3, 1/3)$ (この 4 点が極値を与える候補). $f_{xx} = 2y, f_{xy} = 2x + 2y - 1, f_{yy} = 2x$ より, $D(x,y) = f_{xx}(x,y)f_{yy}(x,y) - f_{xy}(x,y)^2 = 4xy - (2x + 2y - 1)^2$. $D(0,0) = D(1,0) = D(0,1) = -1 < 0$ より, $f(x,y)$ は $(0,0), (1,0), (0,1)$ で極値を取らない. 一方 $D(1/3, 1/3) = 1/3 > 0, f_{xx}(1/3, 1/3) = 2/3 > 0$ より, $f(x,y)$ は $(1/3, 1/3)$ で極小値 $f(1/3, 1/3) = -1/27$ を取る.
- (4) $f(x,y) = x^3 + 2x^2 + xy + y^2$. $\begin{cases} f_x = 3x^2 + 4x + y = 0 \\ f_y = x + 2y = 0 \end{cases}$ を解いて $(x,y) = (0,0), (-7/6, 7/12)$ (この 2 点が極値を与える候補). $f_{xx} = 6x + 4, f_{xy} = 1, f_{yy} = 2$ より, $D(x,y) = f_{xx}(x,y)f_{yy}(x,y) - f_{xy}(x,y)^2 = 12x + 7$. $D(0,0) = 7 > 0, f_{xx}(0,0) = 4 > 0$ より, $f(x,y)$ は $(0,0)$ で極小値 $f(0,0) = 0$ を取る. 一方, $D(-7/6, 7/12) = -7 < 0$, より, $f(x,y)$ は $(-7/6, 7/12)$ で極値を取らない.
- (5) $f(x,y) = \sin x + \cos y$. $\begin{cases} f_x = \cos x = 0 \\ f_y = -\sin y = 0 \end{cases}$ を解いて $(x,y) = (\frac{\pi}{2} + \pi k, \pi l)$ ($k \in \mathbb{Z}, l \in \mathbb{Z}$). $f_{xx} = -\sin x, f_{xy} = 0, f_{yy} = -\cos y$ より, $D(x,y) = f_{xx}(x,y)f_{yy}(x,y) - f_{xy}(x,y)^2 = \sin x \cos y$. $(\frac{\pi}{2} + \pi k, \pi l)$ (k, l は共に奇数) においては $D(\frac{\pi}{2} + \pi k, \pi l) = 1 > 0, f_{xx}(\frac{\pi}{2} + \pi k, \pi l) = 1 > 0$ より, $f(x,y)$ は極小値 $f(\frac{\pi}{2} + \pi k, \pi l) = -2$ を取る. また, $(\frac{\pi}{2} + \pi k, \pi l)$ (k, l は共に偶数) においては $D(\frac{\pi}{2} + \pi k, \pi l) = 1 > 0, f_{xx}(\frac{\pi}{2} + \pi k, \pi l) = -1 < 0$ より, $f(x,y)$ は極大値 $f(\frac{\pi}{2} + \pi k, \pi l) = 2$ を取る. 一方, $(\frac{\pi}{2} + \pi k, \pi l)$ (k : 偶数, l : 奇数) or (k : 奇数, l : 偶数) においては $D(\frac{\pi}{2} + \pi k, \pi l) = -1 < 0$ より, $f(x,y)$ は極値を取らない.