

数学演習第一（演習第9回）【解答例】

微積：漸近展開、積分の計算(1) 2019年7月3日

0 順に $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)}{x^n} = 0$, $\boxed{\frac{1}{n!}}$, $\boxed{\frac{(-1)^n}{(2n)!}}$, $\boxed{\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}}$, $\boxed{\frac{(-1)^{n-1}}{n}}$, $\boxed{\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}}$, $\boxed{(-1)^n}$.

1 (本問でランダウの記号 $o(x^n)$ を使うときはいつも、 $x \rightarrow 0$ を省略している。)

(1) (d) ($\alpha = -\frac{1}{2}$) を用いて、 $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 + \frac{-\frac{1}{2}}{1!}x + \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{2!}x^2 + o(x^2) = \boxed{1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + o(x^2)}$.

(2) (a) を用いて、 $2^x = (e^{\log 2})^x = e^{(\log 2)x} = \boxed{1 + (\log 2)x + \frac{(\log 2)^2}{2}x^2 + o(x^2)}$.

(3) (a) より $e^{\pm x} = 1 \pm x + \frac{1}{2}x^2 \pm \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 \pm \frac{1}{120}x^5 + o(x^5)$ (複号同順) であるから、

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \boxed{1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \boxed{x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)}.$$

(4) (c) より、 $\log(3+2x) = \log 3 + \log\left(1 + \frac{2x}{3}\right) = \log 3 + \frac{2x}{3} - \frac{1}{2}\left(\frac{2x}{3}\right)^2 + o(x^2) = \boxed{\log 3 + \frac{2}{3}x - \frac{2}{9}x^2 + o(x^2)}$.

(5) 部分分数分解した後に (d) ($\alpha = -1$) を用いて、

$$\begin{aligned} \frac{x}{2-x-x^2} &= \frac{x}{(2+x)(1-x)} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{1-x} - \frac{2}{2+x}\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+\frac{x}{2}}\right) \\ &= \frac{1}{3}\left\{\left(1+x+x^2+x^3+o(x^3)\right) - \left(1-\frac{x}{2}+\left(\frac{x}{2}\right)^2-\left(\frac{x}{2}\right)^3+o(x^3)\right)\right\} = \boxed{\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{8}x^3 + o(x^3)}. \end{aligned}$$

【別法】 $\frac{x}{2-x-x^2} = \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{2}} = \frac{x}{2}\left(1+x+x^2+o(x^2)\right)\left(1-\frac{x}{2}+\left(\frac{x}{2}\right)^2+o(x^2)\right) = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + \frac{3x^3}{8} + o(x^3)$.

(6) (b) より、 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + o(x^6)$. よって、 $\frac{1-\cos x}{x^2} = \boxed{\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} + \frac{x^4}{720} + o(x^4)}$.

(7) 半角の公式と (6) の結果を用いて、

$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 = \frac{\sin^2 x}{x^2} = 2 \cdot \frac{1-\cos 2x}{(2x)^2} = 2\left\{\frac{1}{2} - \frac{(2x)^2}{24} + \frac{(2x)^4}{720} + o(x^4)\right\} = \boxed{1 - \frac{x^2}{3} + \frac{2x^4}{45} + o(x^4)}.$$

【別法】 $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 = \left(1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)\right)^2 = 1 - \frac{x^2}{3} + \frac{2x^4}{45} + o(x^4)$.

(8) (c) より、 $\log(1 \pm x) = \pm x - \frac{x^2}{2} \pm \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \pm \frac{x^5}{5} + o(x^5)$ (複号同順) であるから、

$$\log \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = \frac{1}{2}\{\log(1+x) - \log(1-x)\} = \boxed{x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)}.$$

(9) (a), (b) を用いて、 $e^{-x} \cos x = \left(1-x+\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^3)\right) = \boxed{1-x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)}$.

(10) (b) より $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$ であるから、 $\frac{1}{1+X} = 1 - X + X^2 + o(X^2)$ ($X \rightarrow 0$) を用いて、

$$\frac{1}{\cos x} = \frac{1}{1 + (-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4))} = 1 - \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right) + \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right)^2 + o(x^4) = \boxed{1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^4)}.$$

【別法】 $\frac{1}{\cos x}$ は偶関数であるから $\frac{1}{\cos x} = a_0 + a_2 x^2 + a_4 x^4 + o(x^4)$ と書ける。このとき、 $\frac{1}{\cos x} \cdot \cos x = 1$ であるから、

$$1 = (a_0 + a_2 x^2 + a_4 x^4 + o(x^4))\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right) = a_0 + \left(a_2 - \frac{a_0}{2}\right)x^2 + \left(a_4 - \frac{a_2}{2} + \frac{a_0}{24}\right)x^4 + o(x^4).$$

$$a_0 = 1, a_2 - \frac{a_0}{2} = a_4 - \frac{a_2}{2} + \frac{a_0}{24} = 0 \text{ を解いて, } a_0 = 1, a_2 = \frac{1}{2}, a_4 = \frac{5}{24} \text{ を得る。}$$

(11) (10) の結果と (b) を用いて、

$$\tan x = \frac{1}{\cos x} \cdot \sin x = \left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^4)\right)\left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)\right) = \boxed{x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)}.$$

【別法】 $\tan x$ は奇関数であるから $\tan x = b_1 x + b_3 x^3 + b_5 x^5 + o(x^5)$ と書ける。後は $\tan x \cos x = \sin x$ という関係を用いて、(10) の【別法】と同じ議論を行えば b_1, b_3, b_5 の値が定まる。

(12) (b) より $\cos x = 1 + \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + o(x^6)\right)$ であるから、 $\log(1+X) = X - \frac{X^2}{2} + \frac{X^3}{3} + o(X^3)$ ($X \rightarrow 0$) を用いて、

$$\begin{aligned} \log(\cos x) &= \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + o(x^6)\right) - \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right)^2 + \frac{1}{3}\left(-\frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)^3 + o(x^6) \\ &= \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720}\right) + \frac{1}{3}\left(-\frac{x^6}{8}\right) + o(x^6) = \boxed{-\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{45} + o(x^6)}. \end{aligned}$$

【別法】 $\{\log(\cos x)\}' = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\tan x$ であるから、(11) の結果を用いて、

$$\log(\cos x) = - \int_0^x \tan t dt = - \int_0^x \left(t + \frac{t^3}{3} + \frac{2t^5}{15} + o(t^5)\right) dt = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} - \frac{x^6}{45} + o(x^6).$$

$$(13) \quad \tan^{-1} x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^x \left(1 - t^2 + t^4 + o(t^4)\right) dt = \boxed{x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)}.$$

$$(14) \quad (1) の結果を用いて, \quad \sin^{-1} x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \int_0^x \left(1 - \frac{-t^2}{2} + \frac{3(-t^2)^2}{8} + o(t^4)\right) dt = \boxed{x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5)}.$$

[2] (1) (i) $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} = \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x^2 \sin^2 x}$ (分母 $x^2 \sin^2 x$ の漸近展開が x^4 の項から始まるから, 分子を $o(x^4)$ を用いて表す)
 $= \frac{(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3))^2 - x^2(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2))^2}{x^2(x + o(x))^2}$
 $= \frac{(x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)) - x^2(1 - x^2 + o(x^2))}{x^2(x^2 + o(x^2))} = \frac{\frac{2}{3}x^4 + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)} = \frac{\frac{2}{3} + o(1)}{1 + o(1)} \rightarrow \boxed{\frac{2}{3}} \quad (x \rightarrow 0).$

(ii) 分母 $x^2 \log \sqrt{1+x^2} = \frac{1}{2}x^2 \log(1+x^2)$ の漸近展開は x^4 の項から始まるから, 分子を $o(x^4)$ を用いて表せばよい.

$$\frac{e^{\frac{x^2}{2}} - \cosh x}{x^2 \log \sqrt{1+x^2}} = \frac{(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}(\frac{x^2}{2})^2 + o(x^4)) - (1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4))}{\frac{1}{2}x^2(x^2 + o(x^2))} = \frac{\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{\frac{1}{2}x^4 + o(x^4)} = \frac{\frac{1}{6} + o(1)}{1 + o(1)} \rightarrow \boxed{\frac{1}{6}} \quad (x \rightarrow 0).$$

(2) $\log(1+x)^{\frac{1}{x}} = \frac{\log(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)$ であるから, $(1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{\log(1+x)^{\frac{1}{x}}} = e^{1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)} = e \cdot e^{-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)} = e \left\{ 1 + \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} \right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{x}{2} \right)^2 + o(x^2) \right\} = e - \frac{e}{2}x + \frac{11e}{24}x^2 + o(x^2)$. 故に, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \boxed{e - \frac{e}{2n} + \frac{11e}{24n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)}$ ($n \rightarrow \infty$).

[3] (1) (前半の不定積分に対する積分定数は省略する.)

(i) $e^x = t$ とおけば $e^x dx = dt$ であるから, $\int \frac{e^{2x}}{e^x+1} dx = \int \frac{t}{t+1} dt = \int \left(1 - \frac{1}{t+1}\right) dt = \boxed{e^x - \log(e^x+1)}.$

(ii) 部分積分法により,

$$\int x^2 \log x dx = \frac{x^3}{3} \log x - \int \frac{x^3}{3} (\log x)' dx = \frac{x^3 \log x}{3} - \int \frac{x^2}{3} dx = \frac{x^3 \log x}{3} - \frac{x^3}{9} = \boxed{\frac{x^3}{9}(3 \log x - 1)}.$$

(iii) $x^2 = t$ とおけば $x dx = \frac{dt}{2}$ であるから,

$$\int x^3 e^{-x^2} dx = \int t e^{-t} \frac{dt}{2} = \frac{1}{2} \left(-te^{-t} + \int e^{-t} dt \right) = -\frac{1}{2}(t+1)e^{-t} = \boxed{-\frac{1}{2}(x^2+1)e^{-x^2}}.$$

(iv) $\sin x = t$ とおけば $\cos x dx = dt$ であるから,

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{\cos x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{\cos x}{1 - \sin^2 x} dx = \int \frac{dt}{1 - t^2} = \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t} \right) dt = \frac{1}{2} \log \left| \frac{1+t}{1-t} \right| = \boxed{\frac{1}{2} \log \frac{1+\sin x}{1-\sin x}}.$$

(v) $x = \sin \theta$ とおけば $dx = \cos \theta d\theta$ であり, $\begin{array}{c} x \\ \theta \end{array} \left| \begin{array}{l} -\frac{1}{2} \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\pi}{6} \rightarrow \frac{\pi}{3} \end{array} \right.$ と対応する. この範囲で, $\sqrt{1-x^2} = \cos \theta$ であるから,

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \sqrt{1-x^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos \theta \cdot \cos \theta d\theta = \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1+\cos 2\theta}{2} d\theta = \frac{1}{2} \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \boxed{\frac{\pi + \sqrt{3}}{4}}.$$

【別法】この定積分はある図形(半円の一部)の面積を表すので、その面積を图形的に計算すれば定積分の値が得られる.

(vi) 部分積分法により $I := \int_0^\pi e^{-x} \sin x dx = \left[-e^{-x} \sin x \right]_0^\pi + \int_0^\pi e^{-x} \cos x dx = \left[-e^{-x} \cos x \right]_0^\pi + \int_0^\pi e^{-x} (-\sin x) dx = 1 + e^{-\pi} - I$. よって, $I = \boxed{\frac{1+e^{-\pi}}{2}}$.

(vii) $\int_0^\pi |\sin x - \cos x| dx = \int_0^\pi \left| \sqrt{2} \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right| dx = \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} |\sin x| dx = \sqrt{2} \left(\int_{-\frac{\pi}{4}}^0 (-\sin x) dx + \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \sin x dx \right) = \sqrt{2} \left([\cos x]_{-\frac{\pi}{4}}^0 + [-\cos x]_0^{\frac{3\pi}{4}} \right) = \sqrt{2} \left\{ \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) - \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right) \right\} = \boxed{2\sqrt{2}}.$

【別法】 $|\sin x|$ は周期 π の関数であるから, $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} |\sin x| dx = \int_0^\pi |\sin x| dx = \int_0^\pi \sin x dx = 2$.

(viii) $I_{m,n} = \int_0^\pi (\sin mx)(\sin nx) dx$ とおく (m, n は自然数). まず, $m \neq n$ のとき, 三角関数の積和の公式を用いて,

$$I_{m,n} = -\frac{1}{2} \int_0^\pi \{ \cos(m+n)x - \cos(m-n)x \} dx = -\frac{1}{2} \left[\frac{\sin(m+n)x}{m+n} - \frac{\sin(m-n)x}{m-n} \right]_0^\pi = \boxed{0}.$$

$m = n$ のときは, $I_{n,n} = \frac{1}{2} \int_0^\pi (1 - \cos 2nx) dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{\sin 2nx}{2n} \right]_0^\pi = \boxed{\frac{\pi}{2}}$.

(2) (i) $c > 1$ を定数として, $F(x) = \int_c^x \frac{dt}{\log t}$ ($x > 1$) とおけば, $F'(x) = \frac{1}{\log x}$. よって, $f(x) = F(x^3) - F(x^2)$ に合成関数の微分法を適用することにより,

$$f'(x) = F'(x^3) \cdot 3x^2 - F'(x^2) \cdot 2x = \frac{1}{\log x^3} \cdot 3x^2 - \frac{1}{\log x^2} \cdot 2x = \boxed{\frac{x^2 - x}{\log x}}.$$

(ii) $g(x) = x \int_0^x \sin t dt - \int_0^x t \sin t dt$ であるから, $g'(x) = 1 \cdot \int_0^x \sin t dt + x \cdot \sin x - x \sin x = [-\cos t]_0^x = \boxed{1 - \cos x}$.