

## 数学演習第二（演習 第12回）【解答例】

微積：重積分 [2] (重積分の変数変換) 2023年1月25日

### 【演習問題】

**1** (1)  $\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$  より,  $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$ . よって,

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \left( \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{(ad-bc)^2} \begin{vmatrix} d & -b \\ -c & a \end{vmatrix} = \boxed{\frac{1}{ad-bc}}.$$

実は、一般に  $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \left[ \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right]^{-1}$  が成り立つので、 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}$  と計算してもよい。

(2)  $y = uv, x = u - y = u(1-v)$  であるから、 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 1-v & -u \\ v & u \end{vmatrix} = (1-v)u + uv = \boxed{u}$ .

(3)  $\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} a \cos^n \theta & -nar \cos^{n-1} \theta \sin \theta \\ b \sin^n \theta & nbr \sin^{n-1} \theta \cos \theta \end{vmatrix} = a \cos^{n-1} \theta \cdot b \sin^{n-1} \theta \cdot nr \begin{vmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = \boxed{nab r (\cos \theta \sin \theta)^{n-1}}$ .


(4)  $\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \varphi)} = \begin{vmatrix} a \sin \theta \cos \varphi & ar \cos \theta \cos \varphi & -ar \sin \theta \sin \varphi \\ b \sin \theta \sin \varphi & br \cos \theta \sin \varphi & br \sin \theta \cos \varphi \\ c \cos \theta & -cr \sin \theta & 0 \end{vmatrix} = abc r^2 \sin \theta \begin{vmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \cos \theta \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \sin \varphi & \cos \varphi \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{vmatrix}$   
 $= abc r^2 \sin \theta (\cos^2 \theta \cos^2 \varphi + \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + \cos^2 \theta \sin^2 \varphi) = \boxed{abc r^2 \sin \theta}$ .

**2** (1)  $u = x + y, v = x - y$  とおけば、 $x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}$ ,  $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$  であり,  $D$  は  $1 \leq u \leq 2, |v| \leq 1$  に対応する。よって,

$$I_1 = \iint_{\substack{1 \leq u \leq 2 \\ -1 \leq v \leq 1}} \frac{1}{2}(u+v) \log u \cdot \left| -\frac{1}{2} \right| dudv = \frac{1}{4} \int_1^2 du \int_{-1}^1 (u+v) \log u dv = \frac{1}{2} \int_1^2 u \log u du$$
 $= \frac{1}{2} \left( \left[ \frac{1}{2} u^2 \log u \right]_1^2 - \frac{1}{2} \int_1^2 u^2 \cdot \frac{1}{u} du \right) = \frac{1}{2} \left( 2 \log 2 - \frac{1}{2} \int_1^2 u du \right) = \log 2 - \frac{1}{4} \left[ \frac{u^2}{2} \right]_1^2 = \boxed{\log 2 - \frac{3}{8}}.$

(2)  $u = x + y, v = 2x - y$  とおけば、 $x = \frac{u+v}{3}, y = \frac{2u-v}{3}$ ,

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{vmatrix} = -\frac{1}{3}. \quad \text{このとき } D \text{ は } 0 \leq u \leq 1, -u \leq v \leq 2u \text{ に対応する (三角形の頂点の対応に注目) から,}$$




$$I_2 = \iint_{\substack{0 \leq u \leq 1 \\ -u \leq v \leq 2u}} \frac{v^2}{1+u^4} \cdot \frac{1}{3} dudv = \frac{1}{3} \int_0^1 du \int_{-u}^{2u} \frac{v^2}{1+u^4} dv$$
 $= \frac{1}{3} \int_0^1 \left[ \frac{1}{3} \frac{v^3}{1+u^4} \right]_{v=-u}^{v=2u} du = \frac{1}{9} \int_0^1 \frac{9u^3}{1+u^4} du = \left[ \frac{1}{4} \log(1+u^4) \right]_0^1 = \boxed{\frac{1}{4} \log 2}.$

(3)  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$  (極座標変換) とおけば,

$$I_3 = \iint_{\substack{0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq \pi/2}} r^2 (\cos \theta + \sin \theta)^2 \cdot r dr d\theta = \left( \int_0^1 r^3 dr \right) \left( \int_0^{\pi/2} (1 + 2 \cos \theta \sin \theta) d\theta \right)$$
 $= \frac{1}{4} \left[ \theta + \sin^2 \theta \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{4} \left( \frac{\pi}{2} + 1 \right) = \boxed{\frac{\pi+2}{8}}.$

(4)  $u = x + y, v = x - y$  とおけば、 $x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}$ ,

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}. \quad \text{このとき } D \text{ は } 0 \leq u \leq 1, -u \leq v \leq u \text{ に対応する (三角形の頂点の対応に注目) から,}$$



$$I_4 = \iint_{\substack{0 \leq u \leq 1 \\ -u \leq v \leq u}} \frac{\sqrt{u^2 - v^2}}{2} \cdot \left| -\frac{1}{2} \right| dudv = \frac{1}{4} \int_0^1 du \underbrace{\int_{-u}^u \sqrt{u^2 - v^2} dv}_{\text{半径 } u \text{ の半円の面積}} = \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{\pi}{2} u^2 du = \boxed{\frac{\pi}{24}}.$$

【別法】累次積分でも計算できる。

$$\begin{aligned} I_4 &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \sqrt{xy} dy = \frac{2}{3} \int_0^1 x^{1/2} (1-x)^{3/2} dx \stackrel{x=\sin^2 t}{=} \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} \sin t \cos^3 t \cdot 2 \sin t \cos t dt \\ &= \frac{4}{3} \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cos^4 t dt = \frac{4}{3} \int_0^{\pi/2} (\cos^4 t - \cos^6 t) dt = \frac{4}{3} \left( \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} - \frac{5 \cdot 3 \cdot 1}{6 \cdot 4 \cdot 2} \right) \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{24}. \end{aligned}$$

あるいは、 $x = r \cos^2 \theta$ ,  $y = r \sin^2 \theta$  とおいて、 $I_4 = \iint_{\substack{0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq \pi/2}} r \cos \theta \sin \theta \cdot 2r \cos \theta \sin \theta d\theta$  と計算してもよい。

(5)  $u = \sqrt{x}$ ,  $y = \sqrt{y}$  とおけば、 $x = u^2$ ,  $y = v^2$ ,  $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 4uv$  で、 $D$  は  $u \geq 0$ ,  $v \geq 0$ ,  $u + v \leq 1$  に対応する。

$$\begin{aligned} I_5 &= \iint_{\substack{u \geq 0, v \geq 0 \\ u+v \leq 1}} u^2 v^2 \cdot 4uv du dv = 4 \int_0^1 du \int_0^{1-u} u^3 v^3 dv = \int_0^1 u^3 (1-u)^4 du \quad (= B(4, 5) = \frac{3!4!}{8!}) \\ &= \left[ -\frac{1}{5} u^3 (1-u)^5 \right]_0^1 + \frac{3}{5} \int_0^1 u^2 (1-u)^5 du = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{6} \int_0^1 u (1-u)^6 du = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{7} \int_0^1 (1-u)^7 du = \boxed{\frac{1}{280}}. \end{aligned}$$

【別法】 $x = r \cos^4 \theta$ ,  $y = r \sin^4 \theta$  とおけば、 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = 4r(\cos \theta \sin \theta)^3$  であるから、


$$\begin{aligned} I_5 &= \iint_{\substack{0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq \pi/2}} (r \cos^4 \theta)(r \sin^4 \theta) \cdot 4r(\cos \theta \sin \theta)^3 dr d\theta = 4 \left( \int_0^1 r^3 dr \right) \left( \int_0^{\pi/2} \left( \frac{\sin 2\theta}{2} \right)^7 d\theta \right) \\ &= \frac{1}{128} \int_0^{\pi/2} \sin^7 \varphi \frac{d\varphi}{2} = \frac{1}{128} \int_0^{\pi/2} \sin^7 \varphi d\varphi = \frac{1}{128} \cdot \frac{6 \cdot 4 \cdot 2}{7 \cdot 5 \cdot 3} = \frac{1}{280}. \end{aligned}$$

(6)  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$  (極座標変換) とおけば、 $D$  は  $0 \leq r \leq \cos \theta$ ,  $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$  に対応するから、

$$\begin{aligned} I_6 &= \iint_{\substack{0 \leq r \leq \cos \theta \\ -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2}} \sqrt{1-r^2} r dr d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{\cos \theta} r \sqrt{1-r^2} dr = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[ -\frac{1}{3}(1-r^2)^{3/2} \right]_{r=0}^{r=\cos \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1-|\sin \theta|^3) d\theta = \frac{2}{3} \int_0^{\pi/2} (1-\sin^3 \theta) d\theta = \frac{2}{3} \left( \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right) = \boxed{\frac{\pi}{3} - \frac{4}{9}}. \end{aligned}$$

(7) 与えられた曲線を  $y = f(x)$  ( $0 \leq x \leq 1$ ) と表せば、

$$\begin{aligned} I_7 &= \int_0^1 dx \int_0^{f(x)} x dy = \int_0^1 x f(x) dx = \int_0^{\pi/2} xy \frac{dx}{dt} dt = \int_0^{\pi/2} t \cos^2 t \sin t dt \\ &= -\frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} t (\cos^3 t)' dt = \frac{1}{3} \left( -\left[ t \cos^3 t \right]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos^3 t dt \right) = \frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} \cos^3 t dt = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \boxed{\frac{2}{9}}. \end{aligned}$$



【別法】 $x = \sin t$ ,  $y = st \cos t$  ( $0 \leq s \leq 1$ ,  $0 \leq t \leq \pi/2$ ) で変数変換する。 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} = -t \cos^2 t$  より、

$$I_7 = \iint_{\substack{0 \leq s \leq 1 \\ 0 \leq t \leq \pi/2}} \sin t \cdot t \cos^2 t ds dt = \int_0^{\pi/2} t \cos^2 t \sin t dt = \frac{2}{9}.$$

**3** (1)  $u = x + y$ ,  $v = y + z$ ,  $w = z + x$  とおくと、 $u + v + w = 2(x + y + z)$  より、 $x = \frac{u + v + w}{2} - v = \frac{u - v + w}{2}$ ,

$$y = \frac{u + v - w}{2}, z = \frac{-u + v + w}{2} \text{ となり}, \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{8} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{2}. \text{ よって,}$$

$$\begin{aligned} J_1 &= \iiint_E \frac{u-v+w}{2} \cdot \frac{u+v-w}{2} \cdot \frac{-u+v+w}{2} \cdot \frac{1}{2} du dv dw \quad (E : 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1, 0 \leq w \leq 1) \\ &= \frac{1}{16} \iiint_E \{ -(u^3 + v^3 + w^3) + (u^2 v + u v^2 + v^2 w + v w^2 + w^2 u + w u^2) - 2uvw \} du dv dw \\ &= \frac{1}{16} \left( -3 \cdot \frac{1}{4} + 6 \cdot \frac{1}{6} - 2 \cdot \frac{1}{8} \right) du = \boxed{0}. \end{aligned}$$

(2)  $x \leq z \leq 2x$  となる  $z$  が存在するとき  $x \geq 0$  であるから、

$$\begin{aligned} J_2 &= \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq a^2 \\ x \geq 0}} dx dy \int_x^{2x} xz dz = \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq a^2 \\ x \geq 0}} \left[ \frac{1}{2} x z^2 \right]_{z=x}^{z=2x} dx dy = \frac{3}{2} \iint_{\substack{x^2+y^2 \leq a^2 \\ x \geq 0}} x^3 dx dy \\ &\stackrel{\text{極座標変換}}{=} \frac{3}{2} \iint_{\substack{0 \leq r \leq a \\ -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2}} r^3 \cos^3 \theta \cdot r dr d\theta = \frac{3}{2} \left( \int_0^a r^4 dr \right) \left( 2 \int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta \right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{a^5}{5} \cdot \frac{4}{3} = \boxed{\frac{2a^5}{5}}. \end{aligned}$$

【別法】 極座標変換を用いずに  $\iint_{\substack{x^2+y^2 \leq a^2 \\ x \geq 0}} x^3 dx dy = \int_{-a}^a dy \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} x^3 dx$  と累次積分で計算してもよい。

(3) 空間の極座標変換  $x = r \sin \theta \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \theta \sin \varphi$ ,  $z = r \cos \theta$  を用いて,

$$\begin{aligned} J_3 &= \iiint_{\substack{0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} \sqrt{1-r^2} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = \left( \int_0^1 r^2 \sqrt{1-r^2} dr \right) \left( \int_0^\pi \sin \theta d\theta \right) \left( \int_0^{2\pi} d\varphi \right) \\ &= 4\pi \int_0^1 r^2 \sqrt{1-r^2} dr = 4\pi \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cos t \cdot \cos t dt \quad (r = \sin t) \\ &= 4\pi \int_0^{\pi/2} (\sin^2 t - \sin^4 t) dt = 4\pi \left( \frac{1}{2} - \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} \right) \frac{\pi}{2} = \boxed{\frac{\pi^2}{4}}. \end{aligned}$$

(4) 空間の極座標変換  $x = r \sin \theta \cos \varphi$ ,  $y = r \sin \theta \sin \varphi$ ,  $z = r \cos \theta$  を用いて,

$$\begin{aligned} J_4 &= \iiint_{\substack{a \leq r \leq b \\ 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} \frac{1}{r^p} \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = \left( \int_a^b r^{2-p} dr \right) \left( \int_0^\pi \sin \theta d\theta \right) \left( \int_0^{2\pi} d\varphi \right) \\ &= \begin{cases} \frac{4\pi}{p-3} (a^{3-p} - b^{3-p}) & (p \neq 3 \text{ のとき}) \\ 4\pi \log \frac{b}{a} & (p = 3 \text{ のとき}) \end{cases}. \end{aligned}$$

**4** (1)  $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$  を極座標  $(r, \theta)$  で表すと  $(r^2)^2 = (r \cos \theta)^2 - (r \sin \theta)^2 = r^2 \cos 2\theta$ , 整理して  $r = \sqrt{\cos 2\theta}$ . よって, 曲線が囲む部分は  $0 \leq r \leq \sqrt{\cos 2\theta}$  ( $\theta$  は  $\cos 2\theta \geq 0$  となる範囲) と表される (微積教科書 p.121 の下に図がある). 曲線が  $x$  軸,  $y$  軸に関して対称であることは方程式から明らかであるから, 第1象限にある部分  $0 \leq r \leq \sqrt{\cos 2\theta}$  ( $0 \leq \theta \leq \pi/4$ ) の面積を4倍すれば求める面積 ( $S_1$  とする) になる.

$$S_1 = 4 \iint_{\substack{0 \leq r \leq \sqrt{\cos 2\theta} \\ 0 \leq \theta \leq \pi/4}} r dr d\theta = 4 \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} r dr = 4 \int_0^{\pi/4} \frac{1}{2} (\sqrt{\cos 2\theta})^2 d\theta = 2 \int_0^{\pi/4} \cos 2\theta d\theta = \boxed{1}.$$

(2) この曲線も  $x$  軸および  $y$  軸に関して対称であり, 第1象限においてこの曲線と座標軸の囲む部分の面積を4倍すれば求める面積 ( $S_2$  とする) になる.  $x = ar \cos^3 \theta$ ,  $y = br \sin^3 \theta$  とおけば,

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} a \cos^3 \theta & -3ar \cos^2 \theta \sin \theta \\ b \sin^3 \theta & 3br \sin^2 \theta \cos \theta \end{vmatrix} = 3ab r (\cos \theta \sin \theta)^2 = \frac{3ab}{4} r \sin^2 2\theta$$

であるから, 求める面積は

$$\begin{aligned} S_2 &= \iint_{(x/a)^{2/3} + (y/b)^{2/3} \leq 1} dx dy = 4 \iint_{\substack{0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \theta \leq \pi/2}} \frac{3ab}{4} r \sin^2 2\theta dr d\theta \\ &= 3ab \left( \int_0^1 r dr \right) \left( \int_0^{\pi/2} \sin^2 2\theta d\theta \right) = 3ab \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \sin^2 \varphi d\varphi = \boxed{\frac{3}{8}\pi ab}. \end{aligned}$$

(3) 考えている部分は  $0 \leq z \leq 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $x^2 + y^2 \leq x$  と表される. 円板  $x^2 + y^2 \leq x$  は円板  $x^2 + y^2 \leq 1$  に含まれるから, 求める体積  $V_3$  は

$$V_3 = \iint_{x^2 + y^2 \leq x} dx dy \int_0^{1-\sqrt{x^2+y^2}} dz = \iint_{x^2 + y^2 \leq x} (1 - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy.$$

ここで,  $x^2 + y^2 \leq x$  は極座標  $(r, \theta)$  を用いて  $0 \leq r \leq \cos \theta$  ( $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ ) と表されるから,

$$\begin{aligned} V_3 &= \iint_{\substack{0 \leq r \leq \cos \theta \\ -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2}} (1 - r)r dr d\theta = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{\cos \theta} (r - r^2) dr = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left( \frac{1}{2} \cos^2 \theta - \frac{1}{3} \cos^3 \theta \right) d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left( \cos^2 \theta - \frac{2}{3} \cos^3 \theta \right) d\theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \boxed{\frac{\pi}{4} - \frac{4}{9}}. \end{aligned}$$

(4) 放物面と平面で囲まれた部分  $E_1 : 2x \leq z \leq 1 - x^2 - y^2$  の体積を  $V_{41}$  とし,  $E_1$  のうちで  $x \geq 0$  となる部分  $E_2 : 0 \leq 2x \leq z \leq 1 - x^2 - y^2$  の体積を  $V_{42}$  とする.  $E_1$  においては  $2x \leq 1 - x^2 - y^2$  であるから,

$$\begin{aligned} V_{41} &= \iiint_{\substack{2x \leq z \leq 1-x^2-y^2 \\ x^2 + y^2 \leq 1}} dx dy dz = \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} dx dy \int_{2x}^{1-x^2-y^2} dz \\ &= \iint_{(x+1)^2 + y^2 \leq 2} \{2 - (x+1)^2 - y^2\} dx dy. \end{aligned}$$

ここで,  $(-1, 0)$  を中心とする極座標  $(r, \theta)$  をとれば,  $x + 1 = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$  であるから,

$$V_{41} = \iint_{\substack{0 \leq r \leq \sqrt{2} \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi}} (2 - r^2) r dr d\theta = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} (2r - r^3) dr = 2\pi \left[ r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^{\sqrt{2}} = \boxed{2\pi}.$$

次に,  $E_2$  を極座標で表す. 条件  $x \geq 0$  は  $x + 1 = r \cos \theta \geq 1$ , すなわち  $\frac{1}{\cos \theta} \leq r (\leq \sqrt{2})$  と表され,  $\theta$  の範囲は  $-\pi/4 \leq \theta \leq \pi/4$  に限定される. よって,

$$\begin{aligned} V_{42} &= \iint_{\substack{\frac{1}{\cos \theta} \leq r \leq \sqrt{2} \\ -\pi/4 \leq \theta \leq \pi/4}} (2 - r^2) r dr d\theta = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} d\theta \int_{\frac{1}{\cos \theta}}^{\sqrt{2}} (2r - r^3) dr = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \left[ r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_{r=\frac{1}{\cos \theta}}^{r=\sqrt{2}} d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi/4} \left( 1 - \frac{1}{\cos^2 \theta} + \frac{1}{4 \cos^4 \theta} \right) d\theta = \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \{-4 + (1 + \tan^2 \theta)\} \frac{d\theta}{\cos^2 \theta} \\ &= \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \left[ -3 \tan \theta + \frac{1}{3} \tan^3 \theta \right]_0^{\pi/4} = \boxed{\frac{\pi}{2} - \frac{4}{3}}. \end{aligned}$$

(5)  $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = z$  を空間の極座標  $(r, \theta, \varphi)$  を用いて表すと,  $(r^2)^2 = r \cos \theta$  より  $r = (\cos \theta)^{1/3}$ . このとき,  $\cos \theta \geq 0$  であるから  $0 \leq \theta \leq \pi/2$ . また,  $\varphi$  は制限を受けないので  $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ . よって, 求める体積  $V_5$  は

$$\begin{aligned} V_5 &= \iiint_{(x^2 + y^2 + z^2)^2 \leq z} dx dy dz = \iiint_{\substack{0 \leq r \leq (\cos \theta)^{1/3} \\ 0 \leq \theta \leq \pi/2 \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = 2\pi \iint_{\substack{0 \leq r \leq (\cos \theta)^{1/3} \\ 0 \leq \theta \leq \pi/2}} r^2 \sin \theta dr d\theta \\ &= 2\pi \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{(\cos \theta)^{1/3}} r^2 \sin \theta dr = 2\pi \int_0^{\pi/2} \frac{1}{3} \cos \theta \sin \theta d\theta = \frac{\pi}{3} \left[ \sin^2 \theta \right]_0^{\pi/2} = \boxed{\frac{\pi}{3}}. \end{aligned}$$

## 【レポート課題】(オンライン提出)

**L** (1)  $u = x + y$ ,  $v = x - y$  とおけば,  $x = \frac{u+v}{2}$ ,  $y = \frac{u-v}{2}$ ,  $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$ . このとき  $D$  は  $0 \leq u \leq 1$ ,  $0 \leq v \leq u$  に対応する(三角形の頂点に注目せよ)から,

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\substack{0 \leq u \leq 1 \\ 0 \leq v \leq u}} \frac{u}{1+v^2} \cdot \left| -\frac{1}{2} \right| du dv = \frac{1}{2} \int_0^1 du \int_0^u \frac{u}{1+v^2} dv = \frac{1}{2} \int_0^1 \left[ u \operatorname{Tan}^{-1} v \right]_{v=0}^{v=u} du \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 2u \operatorname{Tan}^{-1} u du = \frac{1}{4} \left[ (u^2 + 1) \operatorname{Tan}^{-1} u \right]_0^1 - \frac{1}{4} \int_0^1 du = \boxed{\frac{\pi - 2}{8}}. \end{aligned}$$

ここで,  $\int 2u \operatorname{Tan}^{-1} u du$  を部分積分する際に,  $(\operatorname{Tan}^{-1} u)' = 1/(u^2 + 1)$  であることを見越して,  $2u$  の原始関数として  $u^2 + 1$  を選んだ( $u^2$  を選んで部分積分しても計算量が少し増えるだけ).

(2)  $D$  は極座標  $(r, \theta)$  を用いて,  $0 \leq r \leq a$ ,  $\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2$  と表されるから,

$$\begin{aligned} J &= \iint_{\substack{0 \leq r \leq a \\ \pi/4 \leq \theta \leq \pi/2}} (r \cos \theta + 2r \sin \theta)^2 \cdot r dr d\theta = \left( \int_0^a r^3 dr \right) \left( \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\cos^2 \theta + 4 \cos \theta \sin \theta + 4 \sin^2 \theta) d\theta \right) \\ &= \frac{a^4}{4} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \left( \frac{5}{2} - \frac{3}{2} \cos 2\theta + 2 \sin 2\theta \right) d\theta = \frac{a^4}{4} \left[ \frac{5}{2}\theta - \frac{3}{4} \sin 2\theta - \cos 2\theta \right]_{\pi/4}^{\pi/2} = \boxed{\frac{(5\pi + 14)a^4}{32}}. \end{aligned}$$

(3)  $V$  は空間の極座標  $(r, \theta, \varphi)$  を用いて,  $0 \leq r \leq a$ ,  $0 \leq \theta \leq \pi/2$ ,  $0 \leq \varphi \leq \pi$  と表されるから,

$$\begin{aligned} K &= \iiint_{\substack{0 \leq r \leq a \\ 0 \leq \theta \leq \pi/2 \\ 0 \leq \varphi \leq \pi}} (r \sin \theta \cos \varphi)^2 (r \sin \theta \sin \varphi) (r \cos \theta) \cdot r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= \left( \int_0^a r^6 dr \right) \left( \int_0^{\pi/2} \sin^4 \theta \cos \theta d\theta \right) \left( \int_0^\pi \cos^2 \varphi \sin \varphi d\varphi \right) \\ &= \frac{a^7}{7} \left[ \frac{1}{5} \sin^5 \theta \right]_0^{\pi/2} \left[ -\frac{1}{3} \cos^3 \theta \right]_0^\pi = \frac{a^7}{7} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} = \boxed{\frac{2a^7}{105}}. \end{aligned}$$

(4)  $(x^2 + y^2)^3 = x^2$  を極座標  $(r, \theta)$  で表せば  $(r^2)^3 = (r \cos \theta)^2$  より  $r = \sqrt{|\cos \theta|}$ . この曲線は  $x$  軸,  $y$  軸に関して対称であるから, 求める面積  $S$  は第1象限にある部分  $0 \leq r \leq \sqrt{|\cos \theta|}$  ( $0 \leq \theta \leq \pi/2$ ) の面積を4倍して,

$$S = \iint_{(x^2 + y^2)^3 \leq x^2} dx dy = 4 \iint_{\substack{0 \leq r \leq \sqrt{|\cos \theta|} \\ 0 \leq \theta \leq \pi/2}} r dr d\theta = 4 \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\sqrt{|\cos \theta|}} r dr = 2 \int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta = \boxed{2}.$$