

## 数学演習第一（演習第3回）【解答例】

微積：合成関数の微分法, 逆関数の微分法等 (2026年5月20日実施)

### 演習問題

1 (1) 合成関数の微分法により,

$$f'(x) = a^{x^2+2x} \log a \cdot (x^2 + 2x)' = \boxed{2(x+1)a^{x^2+2x} \log a}.$$

(2)  $f(x)$  の定義域は  $x > e$  である. 合成関数の微分法により,

$$f'(x) = \frac{(\log(\log x))'}{\log(\log x)} = \frac{1}{\log(\log x)} \cdot \frac{(\log x)'}{\log x} = \boxed{\frac{1}{x(\log x) \log(\log x)}}.$$

(3) まず,  $g(x) = x^x$  とおけば,  $\log g(x) = x \log x$  より,

$$\frac{g'(x)}{g(x)} = \log x + x \cdot \frac{1}{x} = \log x + 1, \quad g'(x) = x^x (\log x + 1).$$

(あるいは,  $g'(x) = (e^{x \log x})' = e^{x \log x} \cdot (x \log x)' = x^x (\log x + 1)$  と計算することもできる.) よって,  
 $f(x) = x^{g(x)}$ ,  $\log f(x) = g(x) \log x$  より,

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = g'(x) \log x + \frac{g(x)}{x} = x^x \left( (\log x + 1) \log x + \frac{1}{x} \right), \quad f'(x) = \boxed{x^{x^x+x} \left( (\log x + 1) \log x + \frac{1}{x} \right)}.$$

(4)  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$  と合成関数の微分法により,

$$f'(x) = \frac{(x + 2\sqrt{x})'}{2\sqrt{x} + 2\sqrt{x}} = \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x} + 2\sqrt{x}} = \boxed{\frac{1 + \sqrt{x}}{2\sqrt{x}\sqrt{x} + 2\sqrt{x}}}.$$

(5)  $\log |f(x)| = \frac{1}{3} \log(x^2 + 1) - \log |x - 1|$  の両辺を  $x$  で微分すると,

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{2x}{3(x^2 + 1)} - \frac{1}{x - 1} = \frac{-(x^2 + 2x + 3)}{3(x - 1)(x^2 + 1)}.$$

$$\therefore f'(x) = \frac{\sqrt[3]{x^2 + 1}}{x - 1} \cdot \frac{-(x^2 + 2x + 3)}{3(x - 1)(x^2 + 1)} = \boxed{-\frac{x^2 + 2x + 3}{3(x - 1)^2(x^2 + 1)^{2/3}}}.$$

(6) まず,  $f(x)$  の分子・分母に  $\sqrt{a^2 + x^2} + \sqrt{a^2 - x^2}$  をそれぞれ掛けて,

$$f(x) = \frac{(\sqrt{a^2 + x^2} + \sqrt{a^2 - x^2})^2}{(a^2 + x^2) - (a^2 - x^2)} = \frac{a^2}{x^2} + \frac{\sqrt{a^4 - x^4}}{x^2}.$$

これを  $x$  で微分すると,

$$f'(x) = -\frac{2a^2}{x^3} - \frac{2x}{\sqrt{a^4 - x^4}} - \frac{2\sqrt{a^4 - x^4}}{x^3} = \boxed{-\frac{2a^2}{x^3} \left( 1 + \frac{a^2}{\sqrt{a^4 - x^4}} \right)}.$$

(7)  $\log f(x) = (\cos x) \log(\sin x)$  より,  $\frac{f'(x)}{f(x)} = (-\sin x) \cdot \log(\sin x) + \cos x \cdot \frac{\cos x}{\sin x}$ . よって,

$$f'(x) = f(x) (\log f(x))' = \boxed{(\sin x)^{\cos x} \left\{ -(\sin x) \log(\sin x) + \frac{\cos^2 x}{\sin x} \right\}}.$$

2 (1)  $y = \text{Sin}^{-1} x$  とおけば,  $x = \sin y$  ( $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ ),  $\frac{dx}{dy} = \cos y = \sqrt{1 - x^2}$  より,  $\frac{dy}{dx} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}}$ .

(2)  $y = \text{Cos}^{-1} x$  とおけば,  $x = \cos y$  ( $0 \leq y \leq \pi$ ),  $\frac{dx}{dy} = -\sin y = -\sqrt{1 - x^2}$  より,  $\frac{dy}{dx} = \boxed{-\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}}$ .

(3)  $y = \text{Tan}^{-1} x$  とおけば,  $x = \tan y$  ( $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ ),  $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\cos^2 y} = 1 + x^2$  より,  $\frac{dy}{dx} = \boxed{\frac{1}{1 + x^2}}$ .

3 (1)  $f'(x) = \frac{(x^2)'}{\sqrt{1-(x^2)^2}} = \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}$ .


(2)  $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-(1-x)}} \cdot \frac{-1}{2\sqrt{1-x}} = \frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}}$ .

(3)  $f'(x) = \frac{\frac{1}{1+x^2} \cdot (1+x^2) - \tan^{-1} x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{1-2x \tan^{-1} x}{(1+x^2)^2}$ .

(4)  $f'(x) = -\frac{(\sin x)'}{\sqrt{1-\sin^2 x}} = \frac{-\cos x}{|\cos x|} = \begin{cases} -1 & (\cos x > 0) \\ 1 & (\cos x < 0) \end{cases}$ .

《注》上の事実と  $\text{Cos}^{-1}(\sin n\pi) = \text{Cos}^{-1} 0 = \frac{\pi}{2} \ (n \in \mathbb{Z})$

より,  $y = \text{Cos}^{-1}(\sin x)$  ( $\mathbb{R}$  上で連続) のグラフは右の通り.



(5)  $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{-1/x^2}{1+(1/x)^2} = 0$ . ( $f(x)$  は  $x \neq 0$  で定義され, 微分可能.)

《注》  $\text{Tan}^{-1}(\pm 1) = \pm \frac{\pi}{4}$  であるから上と合わせて,  $f(x) = \pm \frac{\pi}{2} \ (x \geq 0)$  (複号同順).


(6)  $f'(x) = \left( \text{Sin}^{-1} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right)' = \frac{\left( \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right)'}{\sqrt{1-\left( \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right)^2}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - x \cdot \frac{x}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}}{\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}} = \frac{1}{x^2+1}$ .

《注》結果を不思議に思うかもしれないが,  $\text{Sin}^{-1} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \text{Tan}^{-1} x$  が成り立つので当然である. この関係式は次のように示される:  $\theta = \text{Sin}^{-1} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$  とおけば,  $\sin \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \in (-1, 1)$ ,  $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$  より,  $\cos \theta = \sqrt{1-\sin^2 \theta} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$ ,  $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = x$  となるから,  $\theta$  の表現として枠内の関係式が得られる. 実は, 更に

$$\text{Sin}^{-1} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \text{Tan}^{-1} x = \pm \text{Cos}^{-1} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \quad (\pm x \geq 0)$$

が成り立つ (複号同順). この式は  $x \geq 0$  の場合は上の計算から直ちに従う (右図を見れば一目瞭然).

$x \leq 0$  の場合は  $x$  を  $-x$  で置き換え,  $\text{Sin}^{-1}, \text{Tan}^{-1}$  が奇関数であることに注意すればよい.



4 双曲線関数  $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ ,  $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ,  $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$  については微積教科書 p.19 参照. 特に, 次の性質は重要 (三角関数の場合と比較せよ):

$$(\sinh x)' = \cosh x, \quad (\cosh x)' = \sinh x, \quad \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1.$$

これらの性質は定義を用いて容易に確認できる (see 要点).

(1) まず,  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sinh x = \pm\infty$  (複号同順) と中間値の定理により,  $y = \sinh x$  の値域は  $\mathbb{R}$  全体. また,  $\frac{dy}{dx} = \cosh x = \sqrt{1+\sinh^2 x} = \sqrt{1+y^2}$  である.  $\frac{dy}{dx} > 0$  と  $y = \sinh x$  の全射性により,  $y = \sinh x$  の逆関数は  $\mathbb{R}$  全体で定義される. その導関数は  $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$ . 従って,  $(\sinh^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ .

【別解】  $e^{2x} - 2ye^x - 1 = 0$  により  $x = \log(y + \sqrt{1+y^2})$  と具体的な形を求めることができる. よって, その導関数は

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y + \sqrt{1+y^2}} \left( 1 + \frac{y}{\sqrt{1+y^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}.$$

(2)  $y = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$  は, 偶関数で,  $x \geq 0$  において  $y \geq 1$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} \cosh x = \infty$  の単調増加関数である. また,  $\frac{dy}{dx} = \sinh x = \sqrt{\cosh^2 x - 1} = \sqrt{y^2 - 1}$  である.  $\frac{dy}{dx} > 0$  により,  $y = \cosh x \ (x \geq 0)$  の逆関数は  $y \geq 1$  で定義される. その導関数は  $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\sqrt{y^2 - 1}}$ . 従って,  $(\cosh^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \ (x > 1)$ .

【別解】  $e^{2x} - 2ye^x + 1 = 0 \ (x \geq 0)$  により  $x = \log(y + \sqrt{y^2 - 1})$  と具体的な形を求めることができる. よっ

て、その導関数は

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y + \sqrt{y^2 - 1}} \left( 1 + \frac{y}{\sqrt{y^2 - 1}} \right) = \frac{1}{\sqrt{y^2 - 1}}.$$

- (3) まず,  $\tanh x = 1 - \frac{2}{e^{2x} + 1}$  より,  $y = \tanh x$  の値域は  $-1 < y < 1$  である. また,  $\frac{dy}{dx} = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh^2 x} = 1 - \tanh^2 x = 1 - y^2$  である. これにより  $\frac{dy}{dx} > 0$  であることがわかり,  $y = \tanh x$  の逆関数は  $-1 < y < 1$  で定義される. その導関数は  $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{1 - y^2}$ . 従って,  $\boxed{(\tanh^{-1} x)' = \frac{1}{1 - x^2}}$ .

【別解】  $y = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} \Leftrightarrow e^{2x} = \frac{1 + y}{1 - y}$  に注意する.  $e^{2x} > 0$  なので, この等式を満たす  $x \in \mathbb{R}$  が存在するための条件は  $-1 < y < 1$  であり, このとき  $x = \frac{1}{2} \log \frac{1 + y}{1 - y} \left( = \log \sqrt{\frac{1 + y}{1 - y}} \right)$  を得る. よって, その導関数は

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{2} \frac{d}{dy} \{ \log(1 + y) - \log(1 - y) \} = \frac{1}{1 - y^2} \quad (-1 < y < 1).$$

《注》  $\sinh x, \tanh x$  はともに  $\mathbb{R}$  上で単調増加であるから, (実数値関数を考える限りは) 逆関数  $\sinh^{-1} x, \tanh^{-1} x$  の表記に曖昧さはない. 一方,  $\cosh x$  では定義域を  $x \geq 0, x \leq 0$  に制限して得られる 2 通りの逆関数が考えられ, 通常は  $\cosh x (x \geq 0)$  の逆関数に対して  $\cosh^{-1} x$  を割り当てる. 曖昧さをなくするために,  $\sinh^{-1} x, \cosh^{-1} x, \tanh^{-1} x$  の代わりに  $\text{Sinh}^{-1} x, \text{Cosh}^{-1} x, \text{Tanh}^{-1} x$  という記号を用いることもある (微積教科書 p.31 の 3 を参照):

$$\text{Sinh}^{-1} x = \log(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad \text{Cosh}^{-1} x = \log(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad \text{Tanh}^{-1} x = \log \sqrt{\frac{1 + x}{1 - x}}.$$

実は, 複素数値関数としては  $\sinh x, \tanh x$  でも  $x$  の範囲を制限しないと逆関数が一意に定まらない (詳細は省略) ので, 複素数値の場合も考慮して, 上の形の “標準的な” 逆関数を  $\text{Sinh}^{-1} x, \text{Cosh}^{-1} x, \text{Tanh}^{-1} x$  と表そうという訳である.

5 (1)  $f'(x) = \{ \text{Tan}^{-1}(\sinh x) \}' = \frac{(\sinh x)'}{1 + \sinh^2 x} = \frac{\cosh x}{\cosh^2 x} = \boxed{\frac{1}{\cosh x}}.$

(2)  $(\sinh^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$  を用いて,  $f'(x) = \{ \sinh^{-1}(\tan x) \}' = \frac{(\tan x)'}{\sqrt{1 + \tan^2 x}}.$

ここで,  $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$  より,

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \sqrt{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} \cdot |\cos x| = \boxed{\frac{1}{|\cos x|}}.$$

(3)  $\left( \sinh^{-1} \sqrt{x - \frac{1}{2}} \right)' = \frac{1}{\sqrt{1 + x - \frac{1}{2}}} \times \frac{1}{2\sqrt{x - \frac{1}{2}}} = \frac{1}{2\sqrt{x^2 - \frac{1}{4}}} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{4x^2 - 1}}}.$

(4)  $(\tanh x)' = \left( \frac{\sinh x}{\cosh x} \right)' = \frac{1}{\cosh^2 x} = 1 - \tanh^2 x$  を用いて,

$$f'(x) = \{ \tan^{-1}(\tanh x) \}' = \frac{(\tanh x)'}{1 + \tanh^2 x} = \frac{1 - \tanh^2 x}{1 + \tanh^2 x} = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh^2 x + \sinh^2 x}$$

ここで,  $\cosh^2 x = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4}, \sinh^2 x = \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4}$  より,

$$f'(x) = \frac{2}{e^{2x} + e^{-2x}} = \boxed{\frac{1}{\cosh 2x}}.$$

## レポート問題

- (1)  $\frac{d}{dy} \text{Tan}^{-1} y = \frac{1}{1+y^2}$  に注意して合成関数の微分法を用いる.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left( \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x} \right)' \cdot \frac{1}{1+\left(\frac{\sqrt{x^2+1}-1}{x}\right)^2} = \frac{\frac{x^2}{\sqrt{x^2+1}} - \sqrt{x^2+1} + 1}{x^2} \cdot \frac{x^2}{x^2 + (\sqrt{x^2+1}-1)^2} \\ &= \frac{\sqrt{x^2+1}-1}{\sqrt{x^2+1}} \cdot \frac{1}{2(x^2+1-\sqrt{x^2+1})} = \boxed{\frac{1}{2(x^2+1)}} \end{aligned}$$

(実際には,  $x = \tan \theta$  とおくと  $\text{Tan}^{-1}$  の中身の関数は,  $\tan \frac{\theta}{2}$  にまとめられるので  $f(x) = \frac{1}{2} \text{Tan}^{-1} x$  になる.)

- (2)  $\frac{d}{du} \sinh^{-1} u = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}$  に注意して合成関数の微分法を用いる.

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+\cos^2 x}} \cdot (\cos x)' = \boxed{-\frac{\sin x}{\sqrt{1+\cos^2 x}}}$$

- (3)  $y = x^{\cos x}$  とおくと,  $\log y = \cos x \log x$  から,  $\frac{y'}{y} = -\sin x \log x + \frac{\cos x}{x}$  より,

$$\boxed{f'(x) = x^{\cos x} \left( \frac{\cos x}{x} - (\sin x) \log x \right)}.$$

- (4)

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2} \frac{d}{dx} \{ \log(1 + \sin x + \cos x) - \log(1 + \sin x - \cos x) \} \\ &= \frac{1}{2} \left( \frac{\cos x - \sin x}{1 + \sin x + \cos x} - \frac{\cos x + \sin x}{1 + \sin x - \cos x} \right) = \frac{-2(1 + \sin x)}{4 \sin x(1 + \sin x)} = \boxed{-\frac{1}{2 \sin x}} \end{aligned}$$

(実際には  $f(x)$  のルートの中身を  $\frac{1}{\tan \frac{x}{2}}$  と整理することができるので,  $f(x) = -\frac{1}{2} \log \left( \tan \frac{x}{2} \right)$  である.)